

Empfohlene Sträucher und Bäume für Weinberge (WB) und/oder Obstplantagen (OB) in Mitteleuropa

| Lateinischer Name | Nom français Deutscher Name | Standort | max. Höhe | Bemerkungen | Eignung |
|-----------------------------|--|--|--------------|--|-----------------|
| <i>Acer campestre</i> | Erable champêtre Feldahorn | sonnig-halbschattig, feucht-mässig trocken | 4 (10)m | anspruchlos , unter optimalen Bedingungen baumförmig | WB** OB*** |
| <i>Alnus glutinosa</i> | Aulne commun Schwarzerle | schattig feucht-nass | 10- 30m | stattlicher Baum, vertikales Wurzelwerk | WB* OB* |
| <i>Amelanchier ovalis</i> | Amélanchier à feuilles ovales Felsenbirne | sonnig, trocken, Kalk, auch felsig | 4 m | sehr trockenheitsresistent , schlanker Wuchs, dekorative weisse Blüten, Früchte für Marmelade | WB *** OB ** |
| <i>Berberis vulgaris</i> | Epine-vinette Berberitze | sonnig - halbschatten Kalk, trocken - mässig feucht | 3 m | bei gutem Schnitt Nistplatz, dornig, Früchte reich an Vitamin C | WB ** OB *** |
| <i>Colutea arborescens</i> | Baguenaudier Blasenstrauch | sonnig eher trocken, warm, steinig, Kalk | 4 m | fixiert N , erträgt Trockenheit, u.a. Raupenfutterpflanze des stark gefährdeten Blasenstrauch-Bläulings , Nektar für Holzbienen | WB *** OB * |
| <i>Cornus mas</i> | Cornouiller mâle Kornelkirsche | sonnig – halbschatten, warm trocken - mässig feucht, Kalk | 5 m | relativ anspruchslos, Früchte nutzbar (Marmelade) | WB ** OB *** |
| <i>Cotinus coggygria</i> | Perruquier Perückenstrauch | sonnig, trocken, steinig, Kalk | 3 m | sehr trockenheitsresistent , Zierstrauch , attraktive Herbstfärbung der Blätter, Futterpflanze eines Nachtfalters | WB *** OB * |
| <i>Crataegus oxycantha</i> | Aubépine Weissdorn | anspruchlos | 3-5m | Ökologisch sehr wertvoll (Vögel, Falter, Kleinsäuger, andere Insekten) Frühlingsflor, Wirt für Feuerbrand , optimal in Hecken | WB *** OB * |
| <i>Euonymus europaeus</i> | Fusain d'Europe Pfaffenhütchen | halbschattig, mässig feucht nährstoffreich | 5 m | schöne Herbstfärbung, reagiert empfindlich auf trad. Spritzmittel, für Randbereiche | WB * OB *** |
| <i>Frangula alnus</i> | Bourdaïne Faulbaum | eher anspruchslos | 2-(6) m | frühe Blüte, medizinisch genutzt, unter besten Bedingungen baumförmig, für frischere bis feuchte Böden | WB* OB** |
| <i>Hippophae rhamnoides</i> | Argousier Sanddorn | sonnig-halbschattig, trocken, steinig-sandig | 4 m | fixiert N, essbare Früchte reich an Vit. C, auch für kiesige Uferbereiche, Tiefwurzler, stabilisiert Böden , dornig | WB *** OB ** |
| <i>Hippocrepis emerus</i> | Coronille élevée Strauchwicke | sonnig, trocken, warm | 2 m | fixiert N, basische Böden, bleibt niedrig , dekorative gelbe Blüten , schlanker Wuchs, Wildbienen, wertvolle Raupenfutterpflanze | WB *** OB * |
| <i>Juniperus communis</i> | Genévrier Wacholder | sonnig, trocken-mässig feucht Kalk | 7m | langsamwüchsig , konkurrenzschwach, kriechend bis baumförmig (optimale Bedingungen) | WB *** OB ** |
| <i>Laburnum anagyroides</i> | Faux Ebénier Gewöhnlicher | sonnig, durchlässig, warm | 7 m | unter optimalen Bedingungen baumförmig , dekorative gelbe Blüten, anspruchlos , stark giftig | WB** OB** |

Delinat-Institut d'écologie et climatfarming

| | Goldregen | | | | |
|---|---|--|-------|---|------------------|
| <i>Ligustrum vulgare</i> | Troène vulgaire Liguster | halbschattig, warm, kalk | 4 m | genügsam, besonders für Hecken geeignet, nicht für sehr trockene Standorte, Futterpflanze für viele Schmetterlingsraupen | WB ** OB *** |
| <i>Lonicera xylosteum</i> | Camérisier Rote Heckenkirsche | halbschattig- schattig, mässig feucht, nährstoffreich, Kalk | 2 m | niedrig bleibend , für Hecken geeignet, Randbereiche | WB * OB *** |
| <i>Lonicera etrusca</i> | Chèvrefeuille de Toscane Etrusker-Geissblatt | halbschattig, mässig trocken | 1,2 m | windende Liane (an Zeilenenden aufziehen), immergrün, Nektarquelle für Nachtfalter (z.B. Schwärmer) | WB ** OB *** |
| <i>Malus sylvestris</i> | Pommier sauvage Holzapfel | halbschattig-schattig, eher feucht, frisch, nährstoffreich | 10m | Frühlingsflor, wertvoller Nektar- und Pollenspender , Nahrung für zahlreiche Schmetterlingslarven | WB * OB *** |
| <i>Rhamnus cathartica</i> | Nerprun purgatif Kreuzdorn | anspruchlos, Kalk | 3 m | auch für Hecken geeignet, auf verschiedenen Böden, Medizin (Abführmittel) | WB *** OB *** |
| <i>Rosa canina, R. caesia, R. corymbifera, R. obtusifolia</i> | Rosiers (divers) Wildrosen (<i>canina</i> -Gruppe) | sonnig-halbschattig, mässig trocken | 3 m | attraktive Blüten , Nistplätze, Früchte essbar (Hagebutten), Randbereiche oder Hecken, Cordon-Erziehung ratsam, stachlig, Mehltau-Indikator | WB ** OB *** |
| <i>Rosa arvensis</i> | Rosier des champs Feldrose | sonnig-halbschattig, mässig trocken, Lehm Böden | 1 m | niedrig, Halbschatten, eher frische Böden, Hecken und Randbereiche kletternd bis kriechend | WB ** OB *** |
| <i>Rosa rubiginosa</i> | Rosier églantier Wein-Rose | sonnig, trocken, steinig lehmig | 2 m | attraktive rosa Blüten, duftendes Laub, Tiefwurzler, s.a. <i>canina</i> -Gruppe | WB *** OB *** |
| <i>Prunus mahaleb</i> | Bois de Sainte-Lucie Felsenkirsche | sonnig, wärmebedürftig, | 6 m | Frühlingsflor, sehr trockenheitsresistent , wertvolle Raupenfutterpflanze, sehr gut an Weinbergböden adaptiert | WB *** OB * |
| <i>Prunus spinosa</i> | Epine noire, Prunellier Schwarzdorn | sonnig, trocken, eher steinig Kalk | 3 m | Frühlingsflor, bildet Ausläufer (für Hecken und Dickichte geeignet) , essbare Früchte, sehr wertvolle Wildtierpflanze , mit Dornen | WB ** OB ** |
| <i>Sambucus nigra</i> | Sureau noir Schwarzer Holun. | anspruchlos Sonnig-halbschattig | 7 m | Früchte nutzbar (Sirup, Marmelade), schnelles Wachstum, Konkurrenz bei Vögeln beliebt | WB** OB*** |
| <i>Sambucus racemosa</i> | Sureau à grappes Roter Holunder | halbschattig schwach sauer, kalkmeidend | 4 m | wenig trockentolerant, Früchte nutzbar (Sirup, Marmelade), attraktive Früchte bei Vögeln beliebt | WB* OB*** |
| <i>Viburnum lantana</i> | Viorne lantane Wolliger Schneeball | sonnig-halbschattig, mässig trocken, Kalk | 5 m | dicht wachsend, gut in Hecken, Nistplatz, Pflanzenschutz heikel | WB ** OB *** |
| <i>Viburnum opulus</i> | Acier Gemeiner Schneeball | sonnig-halbschattig frisch-sehr feucht, Kalk | 4m | attraktive Beeren und Blüten, für Vögel wertvoll | WB * OB ** |

Etat.: 30.11.2010 (Niggli)

Delinat-Institut d'écologie et climatfarming

Baumschulen mit einheimischen Gehölzen

| |
|--|
| Jean Bavaud |
| <i>Pépiniériste du Gros-de-Vaud</i> |
| Chemin de la Pépinière 4 |
| 1040 Echallens/VD |
| Tel. 021 881 11 90 |
| Fax 021 881 55 17 |
| www.pepinieres-foret.ch |

| |
|-------------------------------|
| Association forestière |
| <i>Pépinières de Genolier</i> |
| Route de Trélex |
| 1272 Genolier/VD |
| Tel. 022 366 14 80 |
| Fax 022 366 15 75 |

| |
|--|
| Walder Baumschulen AG |
| Hofgut Weid 99 |
| 4305 Olsberg |
| Tel. 061-841 18 67 |
| Fax 061-841 19 75 |
| info@walder-baumschulen.ch |
| www.walder-baumschulen.ch |

| |
|---|
| Biohof Gutenbrünnen |
| Martina Schneider, Martin Bracher |
| Gutenbrünnenweg 40 |
| 3125 Toffen |
| Tel. 031 819 97 52 |
| http://biohof-gutenbruennen.ch |

| |
|-------------------------------|
| Naturbaumschule Wenger |
| Roland Wenger |
| Flühmatt |
| 3614 Unterlangenegg |
| Tel. 033-453 23 45 |
| VNG, Bio-Suisse |

| |
|--|
| H.U. Ingold Forstbaumschulen AG |
| Haldimoos 15 |
| CH-4922 Bützberg |
| Telefon: +41 (0)62 963 12 32 |
| Telefax: +41 (0)62 963 14 40 |
| info@ingold-forstbaumschulen.ch |

Delinat-Institut d'écologie et climatfarming